Fauvette pitchou

Sylvia undata – (Ang.) Dartford Warbler

© Yann Février

Description

Petite fauvette colorée (dominante rouge brique sur le bas du corps et gris sur le dessus) à la longue queue caractéristique. Souvent détectée à ses cris et ses vols courts entre deux touffes d'ajoncs. Se pose brièvement en sommet d'ajonc ou sur des branches basses pour émettre son chant.

Statut en Côtes-d'Armor

La Fauvette pitchou est une espèce sédentaire peu commune et localisée. Assez discrète en période hivernale, elle est surtout contactée en période de reproduction dans les landes hétérogènes, souvent riches en ajoncs. Elle colonise les landes littorales, les landes boisées et certains milieux transitoires comme les coupes forestières en régénération, les massifs d'ajoncs pionniers (bords de route, carrières), surtout s'ils sont situés non loin d'autres populations plus importantes. Des secteurs sans ajoncs sont parfois occupés transitoirement (ronciers, fougères).

Dans les habitats favorables que représentent les grandes mosaïques de landes (hautes et basses) à bruyère et ajoncs, elle peut être localement commune (cap d'Erquy, cap Fréhel, landes de Béliard). Le couvert végétal et la stratification de la lande sont des facteurs clés de la présence et de la densité de Fauvette pitchou. Les territoires comprennent le plus souvent une mixité de secteurs bas et ouverts et de secteurs plus fermés généralement composés d'ajoncs hauts. Ces conditions du milieu permettent de mieux comprendre la distribution et la densité de l'espèce à partir de cartographies d'habitats. Sur des landes morcelées ou de petite taille, la Fauvette pitchou peut être difficile à détecter, y compris sur le littoral où certains sites ont fourni des indices puis sont restés inoccupés d'autres années.

Fauvette pitchou Répartition hivernale (2009-2013)



Fauvette pitchou Nidification (2004-2012)



Tendances et perspectives

La Fauvette pitchou est aujourd'hui jugée menacée en France, et la Bretagne possède une Responsabilité Très élevée pour sa conservation. Ses exigences écologiques en font une espèce localisée et étroitement dépendante de l'évolution des milieux, notamment dans l'intérieur des terres où un grand nombre de landes ont disparu ou disparaissent encore au profit de zones agricoles ou de boisements. Les hivers rigoureux sont également des facteurs limitant pour les populations.

Population départementale (tendance connue)	Annexe I Directive Oiseaux (Intérêt européen)	Liste Rouge France Nicheurs (2016)	Liste Rouge Bretagne Nicheurs (2015)	Responsabilité Biologique régionale (2015)
?	X	En Danger	-	Très élevée

UICN & MNHN (2016). Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. Mise à jour 2016.
GIP – Bretagne Environnement (2015). Liste rouge des oiseaux menacés en Bretagne.

Adapté de GEOCA, 2014.
Oiseaux des Côtes-d'Armor.
Statut, Distribution, Tendance. 416 p.

Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor
G.E.O.C.A

GEOCA
10 Boulevard Sévigné
22 000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 60 83 75
https://www.geoca.fr/

Côtes d'Armor le Département

Conseil départemental
9 place du Gal de Gaulle
22023 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 62 62 22
http://cotesdarmor.fr

Actualisé en janvier 2017