Locustelle tachetée

Locustella naevia – (Ang.) Grasshopper warbler

Statut en Côtes-d'Armor

La Locustelle tachetée est un migrateur commun en Côtes-d'Armor à partir de la mi-avril et un nicheur localisé. Durant cette période de passage qui peut se prolonger jusque fin mai/début juin, le chant est émis en tout lieu de halte, abondamment et à toute heure. Par la suite, et surtout quand il y a un nid, le chant est émis du crépuscule à l'aube. Tous ces éléments font de la Locustelle tachetée une espèce fortement discrète et complexe qui n'a jamais fourni d'indices de reproduction certains, hormis la capture de jeunes oiseaux. Les alarmes d'oiseaux à vue sont les rares indices les plus probables de nidification. Les milieux les plus favorables à la nidification sont les landes sèches et humides, les prairies et marais intérieurs ou côtiers, les polders. Les jeunes plantations et lisières forestières et certains sites anthropisés (friches artisanales, aérodromes) figurent parmi les biotopes moins fréquentés mais aussi moins prospectés. L'espèce peut produire 2 voire 3 nichées dans une saison. La Locustelle tachetée hiverne en Afrique de l'ouest.

Locustelle tachetée Nidification (2004-2012)



Description

Fauvette allongée à queue large de coloration générale brun olive terne sur les parties supérieures, tachetée de noire. Dessous blanc cassé. Dessous de la queue strié. Chant très caractéristique : trille vibrante ressemblant à une stridulation d'insecte, généralement émise la nuit mais aussi le jour, notamment en migration prénuptiale.

Tendances et perspectives

Les effectifs nicheurs de Locustelle tachetée présentent de grandes variations interannuelles et leur tendance est difficile à établir en France, même si une régression est notée et la place comme Quasi-menacée. En Bretagne, l'augmentation des indices de nidification possible entre les deux enquêtes régionales traduit une augmentation des effectifs susceptibles de s'y reproduire. S'agissant des Côtes-d'Armor, l'espèce est dorénavant contactée dans le quart nord-ouest, vacant lors de l'enquête 1980-1990, tandis que les milieux forestiers procurent moins d'indices qu'auparavant. A l'avenir, seule la mise en place de suivis standardisés sur certains sites favorables permettrait de mieux apprécier les fluctuations de l'espèce.

Population départementale (tendance connue)	Annexe I Directive Oiseaux (Intérêt européen)	Liste Rouge France Nicheurs (2016)	Liste Rouge Bretagne Nicheurs (2015)	Responsabilité Biologique régionale (2015)
?	-	Quasi-menacée	-	Mineure

UICN & MNHN (2016). Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. Mise à jour 2016.
GIP – Bretagne Environnement (2015). Liste rouge des oiseaux menacés en Bretagne.

Adapté de GEOCA, 2014.
Oiseaux des Côtes-d'Armor.
Statut, Distribution, Tendance. 416 p.

Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor
G.E.O.C.A

GEOCA
10 Boulevard Sévigné
22 000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 60 83 75
https://www.geoca.fr/

Côtes d'Armor le Département

Conseil départemental
9 place du Gal de Gaulle
22023 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 62 62 22
http://cotesdarmor.fr

Actualisé en janvier 2017