Pipit farlouse

Anthus pratensis – (Ang.) Meadow pipit

Description

Pipit fortement rayé dont la teinte générale varie fortement (du brun grisâtre à l'olive chamois sur le dessus et du blanc grisâtre au jaune dessous). Le cri est caractéristique.

Statut en Côtes-d'Armor

Le Pipit farlouse présente deux cartes de répartition très contrastée dans le département où il est un nicheur très localisé, alors qu'il est présent partout en hiver.

En période de nidification, l'espèce se cantonne en secteur littoral dans les dunes, landes, marais et sur les pelouses halophiles alors qu'à l'intérieur il fréquente les grandes landes, quelques prairies humides et les aérodromes. Pour installer son nid au sol, l'espèce recherche une végétation assez basse sans être rase. La population costarmoricaine, forte de plusieurs centaines de couples, est probablement essentiellement sédentaire ou faiblement migratrice.

En automne, le passage, toujours bien marqué, se déroule entre le mois de septembre et le mois de novembre avec un pic en octobre. Le passage printanier, beaucoup plus discret, se déroule de février jusqu'à début mai.

En hivernage, le Pipit farlouse est présent dans une vaste gamme de milieux ouverts, fussent-ils anthropisés comme des pelouses urbaines ou des terrains vagues, même s'il fréquente préférentiellement les landes, les prairies et le littoral.

Pipit farlouse Répartition hivernale (2009-2013)



Pipit farlouse Nidification (2004-2012)



Tendances et perspectives

A l'échelon européen comme français, le Pipit farlouse est en chute libre. Pour notre pays, selon les relevés effectués dans le cadre des enquêtes STOC-EPS, la baisse des nicheurs est de -89% entre 1989 et 2013 et -36% entre 2001 et 2013. Ayant désormais disparu comme reproducteur de nombreuses localités intérieures du département, le Pipit farlouse décline également sur le littoral.

Population départementale (tendance connue)	Annexe I Directive Oiseaux (Intérêt européen)	Liste Rouge France Nicheurs (2016)	Liste Rouge Bretagne Nicheurs (2015)	Responsabilité Biologique régionale (2015)
Plusieurs centaines de couples nicheurs (↘)	-	Vulnérable	Vulnérable	Élevée

Adapté de GEOCA, 2014. Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, Distribution, Tendance. 416 p.

UICN & MNHN (2016). Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. Mise à jour 2016.
GIP – Bretagne Environnement (2015). Liste rouge des oiseaux menacés en Bretagne.

Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor G.E.O.C.A

GEOCA
10 Boulevard Sévigné
22 000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 60 83 75
https://www.geoca.fr/

Côtes d'Armor le Département

Conseil départemental
9 place du Gal de Gaulle
22023 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 62 62 22
http://cotesdarmor.fr

Actualisé en janvier 2017