

Pouillot siffleur

Phylloscopus sibilatrix – (Ang.) Wood warbler


© Yann Février



Statut en Côtes-d'Armor

Migrateur assez rare et nicheur peu commun, le Pouillot siffleur arrive tardivement sur ses lieux de reproduction. Il s'agit essentiellement des grands massifs boisés mais également de boisements plus réduits, y compris littoraux, probablement à la faveur des variations interannuelles que l'espèce présente. L'espèce recherche les futaies avec houppiers assez denses, des troncs plutôt dégagés avec une strate arbustive clairsemée : hêtraies, futaies mixtes de feuillus et résineux... Les exigences écologiques très particulières du Pouillot siffleur conditionnent sa répartition et sa densité en noyaux, par taches souvent très éloignées les unes des autres au sein d'un même boisement. L'espèce hiverne en Afrique équatoriale.

Pouillot siffleur Nidification (2004-2012)



Description

Grand pouillot aux ailes relativement longues et queue plutôt courte. Sourcils, gorge et poitrine jaune vif contrastant avec les parties inférieures blanches et le dessus vert olive. Surtout repéré dans les boisements à son chant caractéristique.

Tendances et perspectives

Les fortes variations interannuelles compliquent les tendances observées, mais le déclin du Pouillot siffleur est tout de même net. En France, la chute des effectifs nicheurs a été de -74% entre 1989 et 2009. En Bretagne, le nombre de mailles occupées a diminué de 13% entre 1985 et 2004. Sa distribution, sa densité et son évolution restent mal connues en Côtes-d'Armor mais on peut penser que son statut est similaire. Le suivi régulier de quelques sites met en évidence une certaine régression des effectifs départementaux depuis la fin des années 1980 puis une certaine stabilisation au cours des années 2000, ce qui concorde avec les observations au niveau national. La révision de la Liste Rouge nationale a d'ailleurs conduit à son déclassement de Vulnérable à Quasi-menacé. Différentes causes additives pourraient être responsables de son déclin : diminution des habitats favorables liés à l'évolution des modes de gestion forestière, enrésinement, altération des zones d'hivernage. L'équilibre des populations de Pouillot siffleur passe indéniablement par le maintien de vieilles futaies de feuillus et de boisements mixtes en espérant que les conditions d'hivernage et de migration restent favorables. Un suivi renouvelé est, en outre, indispensable à mener si l'on souhaite mieux caractériser la population départementale.

Population départementale (tendance connue)	Annexe I Directive Oiseaux (Intérêt européen)	Liste Rouge France Nicheurs (2016)	Liste Rouge Bretagne Nicheurs (2015)	Responsabilité Biologique régionale (2015)
? (↘)	-	Quasi-menacé	Quasi-menacé	Élevée

UICN & MNHN (2016). Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. Mise à jour 2016.
GIP – Bretagne Environnement (2015). Liste rouge des oiseaux menacés en Bretagne.



Adapté de GEOCA, 2014.
Oiseaux des Côtes-d'Armor.
Statut, Distribution, Tendance. 416 p.



GEOCA

10 Boulevard Sévigné
22 000 Saint-Brieuc

Tél. : 02 96 60 83 75
<https://www.geoca.fr/>



Conseil départemental

9 place du G^{al} de Gaulle
22023 Saint-Brieuc

Tél. : 02 96 62 62 22
<http://cotesdarmor.fr>

Actualisé en janvier 2017