


Sterne pierregarin

Sterna hirundo - (Ang.) Common tern

Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, la Sterne pierregarin est une nicheuse peu commune, une migratrice très commune et une hivernante occasionnelle. En 2001, lors du dernier recensement national, la Réserve Naturelle des Sept-Iles (54-58 couples), les archipels du Trégor-Goëlo (66-72 couples) et l'îlot de la Colombière à Saint-Jacut-de-la-Mer (73 couples) accueilleraient l'essentiel des nicheurs. La population départementale a régressé entre les deux comptages nationaux de 1997 et 2011 et elle ne compte plus que 15% des effectifs nicheurs bretons contre 20% auparavant. Les effectifs du Trégor-Goëlo ont été divisés par deux, avec des disparitions locales sur certains secteurs (Sillon de Talbert, archipel des Roho, archipel Saint-Riom...). En migration, des milliers d'individus transitent par le département de juillet à septembre essentiellement (maximum de 660 oiseaux le 16 août 2002 en face du port du Légué). Après le pic de fin août, les effectifs diminuent progressivement et les derniers oiseaux sont notés en novembre. En 30 ans, seules 5 données font état de la présence d'individus isolés entre les mois de décembre et février.

Sterne pierregarin Nidification (2004-2012)



© Yann Février

Description

Sterne de taille moyenne. Dessous gris clair, dessus gris sombre. Longues ailes fines. Adulte nuptial avec une calotte noire, un bec rouge orangé à pointe noire, des pattes rouges.

Tendances et perspectives

Les populations européennes de Sterne pierregarin sont jugées stables globalement et l'espèce n'est pas considérée comme menacée en France et en Bretagne. Toutefois, elle reste inscrite à l'Annexe I de la Directive Oiseaux et est souvent jugée prioritaire à l'échelle régionale au sein des zones Natura 2000. Malgré cela, l'extrême mobilité des populations et la forte redistribution des couples entre les colonies rend difficile le suivi et la gestion des nombreux sites potentiels de reproduction. La faible évolution des effectifs laisse à penser que la population départementale se stabilise, mais n'en reste pas moins fragile du fait de ses caractéristiques pionnières. La distribution de sites fonctionnels et alternatifs sur l'ensemble du littoral breton est un gage de sécurité pour la conservation de l'espèce. La Sterne pierregarin est aussi très sensible aux dérangements et à la prédation. Enfin, il conviendrait également de mieux suivre les populations migratrices. Certains comptages en Ille-et-Vilaine ont permis de comptabiliser des passages journaliers de plusieurs milliers d'individus et il paraît évident que la situation est identique en Côtes-d'Armor.



Adapté de GEOCA, 2014.
Oiseaux des Côtes-d'Armor.
Statut, Distribution, Tendance. 416 p.

Population départementale (tendance connue)	Annexe I Directive Oiseaux (Intérêt européen)	Liste Rouge France Nicheurs (2016)	Liste Rouge Bretagne Nicheurs (2015)	Responsabilité Biologique régionale (2015)
156 couples (2011) (↘)	X	-	-	Élevée

UICN & MNHN (2016). Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. Mise à jour 2016.
GIP - Bretagne Environnement (2015). Liste rouge des oiseaux menacés en Bretagne.



GEOCA
10 Boulevard Sévigné
22 000 Saint-Brieuc

Tél. : 02 96 60 83 75
<https://www.geoca.fr/>



Conseil départemental
9 place du G^{al} de Gaulle
22023 Saint-Brieuc

Tél. : 02 96 62 62 22
<http://cotesdarmor.fr>

Actualisé en janvier 2017