

Ail triquètre

Allium triquetrum



©CD22 TB

Sanitaire

Sécurité routière

Environnement

Classée **invasive avérée** dans le liste du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB)

Elle ressemble à l'ail des ours mais l'ail triquètre est bien plus exode que sa cousine. Elle a été plantée dans les jardins littoraux dans les années 1990. Elle servait de décoration et était appréciée par sa comestibilité (bulbe à goût d'ail). L'ail triquètre se disperse grâce aux fourmis, ce qui accélère son invasion en tapis dense.

Mode de dissémination / Reproduction



Facteur favorisant son expansion

- Milieu frais
- Sol nu

Enjeux

Impacts environnementaux :

- > Forte compétition avec les espèces locales par un recouvrement dense entraînant une perte de biodiversité
- > Forte colonisation des espaces naturels, forme des tapis denses

Cycle biologique et période d'intervention préconisée

Stade/Période	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Observation												
Floraison												
Fructification												
Intervention												

Gestion opérationnelle

Traitement des déchets

Stade de développement	Technique	Préconisation adaptée	Fréquence et période	
PLANTS JEUNE ET ADULTE	Arrachage manuel	Creuser à l'aide d'une fourche bêche sur 30 cm de profondeur et extraire tous les bulbes	• Avant la floraison • Renouveler tant qu'il y aura des repousses. • Pendant au moins trois ans	> Stockage temporaire sur place/séchage sur une bâche hermétique puis compostage dans un centre de traitement > Installation de traitement des déchets ménagers (incinération)