

Baccharis à feuilles d'arroche ou Sénéçon en arbre

Baccharis halimifolia

Réglementée



©CEREMA CP

Sanitaire

Sécurité routière

Environnement

Classée **invasive avérée** dans
le liste du Conservatoire
botanique national
de Brest (CBNB)

Le Baccharis à feuilles d'arroche est une espèce végétale originaire des États-Unis et introduite en Europe au XVII^e siècle. Elle est connue comme plante ornementale sur le bord du littoral. Le baccharis est également connue pour sa résistance face au sel et pour stabiliser les berges. Les graines ailées, dispersées par le vent, forment des «neiges d'octobre» visibles à des kilométriques.

Mode de dissémination / Reproduction



Facteur favorisant son expansion

- Zone nue, remaniée
- Plantation

Enjeux

Sécurité routière :

- > Plante qui favorise les incendies (résine)
- > Dommage possible sur les infrastructures (pont, mur, chaussée, digue)

Risques sanitaires : Précautions : Gants et masque de protections adaptés



- > Les graines sont toxiques si elles sont consommées
- > Le pollen est signalé comme allergène sévère et provoque des symptômes chez les personnes sensibles

Impacts environnementaux :

- > Plante très compétitive pour l'eau et la lumière formant des fourrés très denses (fermeture du milieu)
- > Peut être mangée par le bétail au stade de jeunes pousses mais devient toxique pour le bétail lorsqu'elle grandit
- > Elle entraîne donc une compétition avec la flore locale

Cycle biologique et période d'intervention préconisée

Stade/Période	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Observation												
Floraison												
Fructification												
Intervention												

Gestion opérationnelle

Traitement des déchets

Type de surface	Technique	Préconisation adaptée	Fréquence et période	
PETITE SURFACE COLONISÉE	Arrachage manuel	Le recours herse/étrille et houe rotative	• Avant la production de graines. Le répéter chaque année, pendant plusieurs années et chaque fois que de nouveaux pieds apparaissent	> Exporter les déchets sur une plateforme isolée du sol et hors de toute inondation > Compostage déchet vert
	Coupe manuelle	À l'aide d'une scie d'un sécateur ou d'une serpe	• Avant la période de fructification	
GRANDE SURFACE COLONISÉE	Arrachage mécanique	À l'aide d'un outil spécifique, le "Baccharache", sorte de fourche à levier ou pelle mécanique	• Avant fructification, répété sur plusieurs années et à chaque fois que de nouveaux individus apparaissent	> Valorisation possible en bois énergie
	Fauchage/gyrobroyage	Couper à 10 cm du sol avant fructification. Des rejets peuvent apparaître	• Répéter plusieurs fois par an. • Pendant plusieurs années	
	Le gyrobroyage	À coupler avec d'autres méthodes de gestion	• Aucun	