

Berce du Caucase

Heracleum mantegazzianum

Réglementée ARS



©CD22 TB

Sanitaire

Sécurité routière

Environnement

Classée **invasive potentielle** dans le liste du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB)

La Berce du Caucase est une plante vivace toxique introduite en France à la fin du XIX^e siècle. Elle colonise progressivement certains milieux au détriment de la flore locale.

Mode de dissémination / Reproduction



Facteur favorisant son expansion

- Présence d'eau
- Sol nu

Enjeux

Risques sanitaires :



> Plante contenant des substances photosensibles entraînant des brûlures cutanées graves (jusqu'au 3^e degré) en cas de contact avec la peau essuyer et rincer abondamment à l'eau claire. En cas de découverte, prévenir au plus vite la **FREDON Bretagne**

Tél. 02 23 21 18 18 - fredon@fredon-bretagne.com.

Précautions : Porter des vêtements imperméables ou une combinaison ainsi que des lunettes et des gants pour éviter tout risque de contact avec la peau

Impacts environnementaux :

> Compétition avec les espèces locales par un recouvrement dense entraînant une perte de biodiversité

Cycle biologique et période d'intervention préconisée

Stade/Période	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Observation												
Floraison												
Fructification												
Intervention												

Gestion opérationnelle

Traitement des déchets

Type de surface	Technique	Préconisation adaptée	Fréquence et période	
PETITE SURFACE COLONISÉE	Coupe	À l'aide d'une bêche coupe oblique de la plante sous le collet (soit à 10 cm sous terre)	• 2 passage dans l'année avant la floraison	> Incinération en déchetterie > Compostage industriel > Méthanisation > ISDND
	Arrachage manuel puis végétalisation	Jeunes plants	• Dès la germination	
	Coupe	Des racines avec une bêche	• En début de saison végétatif	
GRAND SURFACE COLONISÉE	Fauchage	Aucune	• 3 fois avant période de production de graines	