

Buddléia du père David ou Arbre à Papillons

Buddleja davidii



© CD22 - CM

Sanitaire

Sécurité routière

Environnement

Classée **invasive potentielle** dans le liste du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB)

Les premiers semis français datent de 1895. L'arbuste s'est ensuite propagé dans les décombres pendant la 2^{de} Guerre Mondiale et plus récemment dans les friches industrielles.

Mode de dissémination / Reproduction



Facteur favorisant son expansion

- Sol nu
- Friche

Enjeux

Sécurité routière :

- > Visibilité des usagers

Impacts environnementaux :

- > Compétition avec les espèces locales, jusqu'à un recouvrement total entraînant une perte de biodiversité
- > Altération des sols (accumulation de phosphore)
- > Piège écologique par le feuillage toxique pour les chenilles

Cycle biologique et période d'intervention préconisée

Stade/Période	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Observation												
Floraison												
Fructification												
Intervention												

Gestion opérationnelle

Traitement des déchets

Stade de développement	Technique	Préconisation adaptée	Fréquence et période	
JEUNE PLANT	Arrachage manuel puis végétalisation et paillage	Aucune	• Avant la floraison	> Séchage sur place sur une bâche > Installation de traitement des déchets ménagers (incinération) > Méthanisation > Compostage industriel > Les grappes des fleurs sont envoyées vers une installation de traitements des déchets ménagers (incinération)
	Arrachage manuel	Retirer les racines à la bêche	• Dès la germination	
	Arrachage mécanique puis végétalisation et paillage	La plante et son système racinaire	• Avant la floraison	
PLANT ADULTE	Fauchage puis végétalisation et paillage	Aucune	• Avant floraison et surveiller pendant plusieurs années	