

Herbe de la pampa

Cortaderia selloana

Réglementée



© CEREMA-CP

Sanitaire

Sécurité routière

Environnement

Classée **invasive avérée** dans le liste du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB)

Connue des pépiniéristes au début du 20^e siècle, cette herbe devient à la mode dans les années 70. L'Herbe de la Pampa, originaire d'Amérique du Sud est redoutée pour sa croissance fulgurante et sa capacité à coloniser les milieux naturels. Depuis 2023, cette plante appréciée dans les intérieurs bohèmes est interdite à la vente en France.

Mode de dissémination / Reproduction



Facteur favorisant son expansion

- Zone nue, friche
- Plantation

Enjeux

Sécurité routière :

- > Importante biomasse aérienne produite, hautement inflammable, (risques d'incendies)
- > Visibilité

Risques sanitaires :

Précautions : Porter des gants et des manches longues lors de l'arrachage 

- > Risques de coupures avec les feuilles et donc d'inflammation lors de la gestion
- > Pollen allergisant

Impacts environnementaux :

- > Compétition avec les espèces locales, car monopolise l'eau, les nutriments et la lumière disponibles, jusqu'à un recouvrement total entraînant une perte de biodiversité

Cycle biologique et période d'intervention préconisée

Stade/Période	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
 Observation												
 Floraison												
 Fructification												
 Intervention												

Gestion opérationnelle

Traitement des déchets

Stade de développement	Technique	Préconisation adaptée	Fréquence et période	 
JEUNE PLANT	Arrachage manuel puis végétalisation et paillage	A l'aide de pioche et bêche. Intervenir sur des terres meuble et humide.	• Avant la fructification	> Installation de traitement des déchets ménagers (incinération) > Exporter les résidus sur une plateforme isolée hors zone inondable > Les feuilles se décomposent mal et bloquent le broyeur donc pas de compostage industriel, laisser sur place
	Éco-pâturage	Aucune	• Trois à quatre fois par an	
PLANT ADULTE	Couper	Les plumeaux	• Avant les 3 premières semaines de floraison	
	Arrachage mécanique puis végétalisation et paillage	Au minimum de 1 mètre avec les racines à la mini pelle	• Avant la production de graine	
	Dessouchage	Avec un tractopelle	• En hiver et en avril	
	Broyage	Épareuse	Avant floraison	