

Laurier palme

Prunus laurocerasus



©CD22-TB

Sanitaire

Sécurité routière

Environnement

Classée **invasive avérée** dans le liste du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB)

Le Laurier Palme est un arbuste originaire d'Asie occidentale, importé en France en 1558. Il a été choisi pour ses qualités ornementales, idéal pour les jardins de la renaissance avec notamment la création de 'chambres de verdure'.

Mode de dissémination / Reproduction



Facteur favorisant son expansion

- Sol nu
- Grande capacité à faire des racines

Enjeux

Sécurité routière :

> Visibilité

Risques sanitaires :

Précautions : Porter des gants



> Ses feuilles et ses fruits (les graines) sont toxiques pour les humains et les animaux (domestiques et d'élevage) en cas de contact ou d'ingestion

Impacts environnementaux :

- > Ombrage important en sous-bois engendrant une compétition avec les espèces locales, jusqu'à un recouvrement presque total entraînant une perte de biodiversité
- > La toxicité de leur fructification et de la litière qu'ils produisent, est néfaste pour la faune sauvage et les colonies de chenilles (dû aux vapeurs de cyanure libérées par les feuilles)

Cycle biologique et période d'intervention préconisée

Stade/Période	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Observation												
Floraison												
Fructification												
Intervention												

Gestion opérationnelle

Traitement des déchets

Stade de développement	Technique	Préconisation adaptée	Fréquence et période	
JEUNE PLANT	Arrachage manuel	Avec une bêche	• Avant la floraison	> Broyage en petits copeaux car ne peuvent plus bouturer puis emmener en centre de compostage (déchet vert) > Branche et tronc valorisable en bois énergie > Les grappes des fleurs sont envoyées vers une installation de traitement des déchets (incinération)
	Arrachage mécanique	Mini-pelle ou autres engins de terrassement (pelle mécanique)	• Avant la fructification	
PLANT ADULTE	Dessouchage	Sur gros calibre : • Couvrez la souche pour éviter les repousses • Veiller à enlever la plante et les racines pour éviter le bouturage	• Octobre -février	