

Séneçon du cap

Senecio inaequidens



©CD22 TB

Sanitaire

Sécurité routière

Environnement

Classée **invasive avérée** dans le liste du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB)

Le Séneçon du Cap est une plante invasive toxique pour le bétail, originaire d'Afrique du Sud. Elle a été introduite en Europe par des importations de pellets de laine de moutons et se répand dans les jardins et prairies. On la trouve surtout le long des routes et des voies ferrées en Bretagne.

Mode de dissémination / Reproduction



Facteur favorisant son expansion

- Zones nues, remaniées

Enjeux

Impacts environnementaux :

- > Produit des substances chimiques qui gênent la croissance des autres plantes
- > Toxique pour le bétail

Cycle biologique et période d'intervention préconisée

Stade/Période	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Observation												
Floraison												
Fructification												
Intervention												

Gestion opérationnelle

Traitement des déchets

Type de surface	Technique	Préconisation adaptée	Fréquence et période	
PETITE SURFACE COLONISÉE	Arrachage manuel puis végétalisation et paillage	Arrachage des plants très facile	• Avant la production de graines. Le répéter chaque année, pendant plusieurs années et chaque fois que de nouveaux pieds apparaissent	> Laisser sur place sur une bâche > Compostage déchets vert > Installation de traitement des déchets ménagers (incinération) > Méthanisation
GRANDE SURFACE COLONISÉE	Fauchage <i>Les résidus de fauche ne doivent donc pas être utilisés comme fourrage.</i>	À 10 cm du sol pour laisser les espèces locales se développer, limite son expansion	• Avant fructification, répétée sur plusieurs années et à chaque fois que de nouveaux individus apparaissent	